

# Ragondin (*Myocastor coypus*)

## Descriptif, écologie et reproduction



### Descriptif :

- × fourrure brune foncée et plus claire sous le ventre
- × corps d'environ 50 à 60 cm et queue (conique et nue) d'environ 40 cm
- × queue cylindrique
- × pattes antérieures munies des grosses griffes
- × pattes postérieures palmées
- × incisives oranges visibles


### Écologie :

- × habitat : zones de marais, rivières, lacs, étangs, digues, etc.
- × creusement de terriers
- × régime alimentaire strictement herbivore
- × espèce à activité majoritairement crépusculaire et nocturne
- × rongeur semi-aquatique
- × longévité estimée à 4 ans

### Reproduction :

- × jusqu'à 3 portées par an
- × jusqu'à 6 jeunes par portée
- × maturité sexuelle vers 6 mois

## Introduction et répartition



Source : [https://inpn.mnhn.fr/espece/cd\\_nom/61667](https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667)

Espèce originaire d'Amérique du Sud, elle a été introduite en France au XIX<sup>e</sup> siècle pour sa fourrure.

Elle occupe aujourd'hui la quasi-totalité de la France.

## Impacts

Impacts sur les activités humaines :

- × consommation des cultures agricoles
- × risque de renversement des engins agricoles dû à la fragilisation des berges
- × affaiblissement des ouvrages hydrauliques (berges, ponts)
- × contamination des eaux douces par les urines et les excréments
- × possible transmission de maladie au bétail et à l'homme (leptospirose, grande douve du foie)

Impacts sur le milieu :

- × creusement de terriers qui entraînent la modification de la morphologie du milieu
- × diminution du couvert végétal